

7.D 2018 Bütünleme Acil Hasta Bakımı

1. I- Adli raporlar fotokopisi 4 nüsha hâlinde düzenlenmelidir.
II- Adli rapor fotokopisinin bir nüshası hastanın dosyasında saklanmalıdır.

III- Düzenlenen raporda olayın nasıl olduğu tarafsızlığı bozacağından savcılığa bırakılmalı yazılamamalıdır.

IV- Düzenlenen raporda fizik muayene bulgularına yer verilmelidir.

Adli rapor düzenlenmesi için yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

- A) I, II, III ve IV
B) I, II ve IV
C) I, III ve IV
D) II, III ve IV
E) II ve IV

Cevap açıklama:

2. Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda hava yolu ve solunumun özelliklerindendir?

- A) Epigiot, daha uzun ve hareketsizdir.
B) Dil, ağız boşluğuna oranla daha küçüktür.
C) Larinks kıkırdakları göreceli olarak daha serttir.
D) Alveollerin sayısı yetişkine göre daha çoktur.
E) Larinks huni şeklinde, erişkinden daha önde ve yukarıda yerleşmiştir.

Cevap açıklama:Büyük oranda yumuşak dokudan oluşur. Ödem nedeniyle hava yolu obstrüksiyonu eğilimi artar. Dil, ağız boşluğuna oranla daha büyüktür. Hava yolu, dil ile kolayca tıkanabilir. Hava yolunu açmak için tekrar pozisyon vermek gerekebilir. Süt dişleri, zayıf bir şekilde tutunmuştur. Geçici dişler kolayca hava yolunu tıkayabilir. Trakea erişkine göre daha kısadır. Epigiotun daha kısa ve daha hareketlidir. Hava yolu anomalileri görülebilir. Entübasyon daha güçtür. Endotrakeal tüpün (ET) doğru yerde korunması daha güçtür. ET sağ ana bronşa kolaylıkla kayabilir. Larinks kıkırdakları göreceli olarak daha yumuşaktır. Boynun hiperekstansiyonu ya da hiperfleksiyonu hava yoluna baskı yapabilir ya da tıkayabilir. Larinks huni şeklinde, erişkinden daha önde ve yukarıda yerleşmiştir. Aspirasyonla tıkanma riski daha yüksektir. Krikoid kıkırdak yumuşaktır, kıkırdak desteği yetersizdir ve trakeanın en dar kısmına yerleşmiştir. ET’de doğal bir kaçağa neden olur. 8 yaşın altındaki çocuklarda uncuff tüpler kullanılır. Hava yolu anatomisi, 8 yaşa doğru erişkin yapıya dönüşür. Hava yollarının küçük, alveollerin küçük ve sayısının az olması nedeniyle kompensatuvar rezervde yetersizlik vardır.

3. Aşağıdakilerden hangisi parasetamol zehirlenmesinde yapılan özgün tanısal testlerden biridir?

- A) Hemogram
B) Kan glukoz düzeyi
C) Serumda parasetamol değeri
D) Serum elektrolit değerleri
E) Elektrokardiyografi (EKG)

Cevap açıklama:Özgün Tanısal Testler: Gerek idrarda gerekse serumda bir takım spesifik testlerle bazı zehirlenme etkenleri kalitatif (nitel) ya da kantitatif (nicel) olarak tayin edilebilir. Serumda, salisilat, parasetamol, antiepileptikler, digoksin, etanol, metanol, pseudokolinesteraz aktivitesi, idrarda esrar, kokain, eroin, amfetaminler gibi etkenler ülkemizde, özellikle de donanımlı sağlık merkezlerinde gösterilebilen etkenler arasındadır.

4. Aşağıdakilerden hangisi sedatif hipnotiklerin yoksunluğunda görülen belirtilerden biridir?

- A) Hipotansiyon
B) Ajitasyon
C) Bradipne
D) Bradikardi
E) Hipotermi

Cevap açıklama:Madde Yoksunluğu Toksidromu: Bu durum ile ilişkili iki klasik tablo söz konusudur. Opiad çekilmesinde hastalarda anksiyete, ılımlı hipertansiyon, taşikardi, lakrimasyon, rinore (burun kanaması), kusma, diyare, midriyatik pupiller, esneme, piloereksiyon (vücut kıllarının dikleşmesi) izlenebilir. Sedatif-hipnotiklerin yoksunluğu daha dramatik seyreder. Hızlı bir şekilde tanınıp tedavi edilmezse öldürücü olabilir. Hipertansiyon, taşikardi, taşipne, hipertermi, ajitasyon, tremor ve deliryum görülebilir. Midriyatik pupiller ve terleme eşlik edebilir. Nöbet geçirme, koma ve ölümle sonuçlanabilir.

ATA-AOT

5. "Sık idrar yapma ihtiyacının olması"nı ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Pollaküri
- B) Poliüri
- C) Disüri
- D) Urgency
- E) Oligüri

Cevap açıklama:Pollaküri: Sık idrar yapma ihtiyacının olmasıdır.

6. Takipne ve apne periyodları ile karakterize, düzensiz solunum şekli aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Wheezing
- B) Kussmaul solunum
- C) Biot solunum
- D) Paroksizmal nokturnal dispne
- E) Hipoventilasyon

Cevap açıklama:Kussmaul solunum: Birbirine eşit, derin inspirasyon ve ekspirasyon olduğu, orta derecede veya hızlı derin solunum şekline denir. • Biot solunumu: Takipne ve apne periyodları ile karakterize, düzensiz solunumdur.

7. Aşağıdakilerden hangisi travmalı bireyin birincil bakısı içinde ver almaz?

- A) Solunum kontrolü
- B) Dolaşım kontrolü
- C) Bilinç kontrolü
- D) Elbiselerin çıkarılması
- E) Allerji kontrolü

Cevap açıklama:

8. Grey-Turner belirtisine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Umbilikus etrafında görülen morarmadır.
- B) Böğür bölgesinde görülen morarmadır.
- C) Diz bölgesinde görülen morarmadır.
- D) Her iki gözaltında görülen morarmadır.
- E) Kulak arkasında görülen morarmadır.

Cevap açıklama:Cullen ve Grey-Turner belirtileri, retroperitoneal kanama göstergesidir. Bu iki belirti genellikle geç ortaya çıkar ve uzun nakiller sırasında ortaya çıkar. ☐ Cullen belirtisi, umbilikus etrafında morarmadır. Grey-Turner ise böğür bölgesinde morarmadır ve künt, kuvvetli bir kanamayı, aorttan sızmayı, pankreas ve böbrekteki bir kanamayı gösterir.

9. Kulak zarı perforasyonu en sık hangi bölgeden olur?

- A) Sağ kulak
- B) Anteroposterior
- C) Posterolateral
- D) İnferolateral
- E) Anteroinferior

Cevap açıklama:

10. Nazolakrimal kanalın tıkanması sonucu lakrimal kesenin akut enfeksiyonuna yol açan, tek taraflı ağrı, kızarıklık ve şişlik oluşmasına neden olan göz hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Meniere hastalığı
- B) Herpes zoster oftalmikus
- C) Dakriosistit
- D) Orbital selülit
- E) Keratit

Cevap açıklama: Dakriosistit Nazolakrimal kanalın tıkanması sonucu lakrimal kesenin akut enfeksiyonudur. Gözyaşı salgısı artar; tek taraflı ağrı, kızarıklık ve şişlik olur. Tedavide antibiyotikler ve antienflamatuar ilaçlar kullanılır. Enfeksiyon geçtikten sonra yapışıklıklar nedeni ile sistem, çoğu kez nazolakrimalis seviyesinde tıkanıldığından cerrahi uygulanır.

AİA-AOT

11. I. Göğüs ağrısı
II. Nefes darlığı
III. Bayılma
IV. Baş ağrısı
V. Mide ağrısı

**Yukarıdakilerden hangileri kardiyak sistem acillerinde görülen
belirti ve bulgular arasında yer alır?**

- A) I ve II
B) I, II ve III
C) I, II, III ve IV
D) I, II, III ve V
E) I, II, III, IV ve V

Cevap açıklama:Kardiyovasküler hastalığı olan hastalar bir dizi şikâyet ve semptomlarla karşımıza gelebilir. Bu hastalarda en sık karşılaşılabileceğimiz semptomlar göğüs ağrısı, göğüste sıkışma hissi, nefes darlığı, çarpıntı, bayılma ve bayıla yazmadır. Bu şikâyetler sık olmakla birlikte bu hastalar omuz ağrısı, mide ağrısı, sırta vuran ağrı gibi daha pek çok şikâyetle de gelebilirler.

12. Aşağıdaki belirti ve bulgulardan hangisi hastada “ inme”
tablosunu düşündürmez?

- A) Motor sorunlar
B) Bilinç/uyanıklıkta bozulma
C) Konuşma veya anlama bozukluğu
D) Vücudun bir yarısında uyuşma, duyu kaybı
E) Psikososyal stres etkenleri

Cevap açıklama:

13. Aşağıdakilerden hangisi psikiyatrik rahatsızlığı olan bireylerin
intihar girişimi için risk oluşturan faktörlerden biri değildir?

- A) Kronik fiziksel hastalığı bulunma
B) Aile ilgisizliği, sosyal destek azlığı
C) Ekonomik yetersizlik, işsizlik
D) Başarılı, ümitli olma
E) Boşanmış, dul olma, yalnız olma

Cevap açıklama:

14. Aşağıdakilerden hangisi onkolojik acillerin ortaya çıkış süreci
ile ilgili doğrudur?

- A) Sadece terminal dönemde görülür.
B) Sadece tanı konduğunda görülür.
C) Sadece kemoterapi sonrasında görülür.
D) Sadece cerrahi tedavi sonrasında görülür.
E) Hastalığın herhangi bir döneminde görülür.

Cevap açıklama:

15. Aşağıdakilerden hangisi kanser hastasında görülen kalp
tamponadının en sık nedenidir?

- A) Akciğer kanseri
B) Sarkomlar
C) Kemoterapiye bağlı hızlı hücre parçalanması
D) Perikardiyosentez yapılması
E) Batına radyoterapi uygulanması

Cevap açıklama:

16. Aşağıdakilerden hangisi tedavi ile ilişkili onkolojik acillerden
biridir?

- A) Kemik iliği baskılanması
B) Trombositopeni
C) Anafilaksi
D) Koagülopati ve akut kanamalar
E) Nötropeni ve nötropenik ateş

Cevap açıklama:Tedavi ilişkili aciller Kemoterapotiklerin damar dışına kaçması Sitokin salınım sendromu Anafilaksi Hemorajik sistit

17. Bağırarak, hakaret etmek, korkutmak, suçlamak, gözardı
etmek ya da aşağılamak aşağıdaki istismar türlerinin
hangisinde yer alır?

- A) Cinsel istismar
B) Psikolojik istismar
C) Ekonomik istismar
D) Fiziksel istismar
E) Hak istismarı

Cevap açıklama:Psikolojik istismar: Bağırarak, hakaret etmek, korkutmak, suçlamak, gözardı etmek ya da aşağılamak gibi örnekler psikolojik istismarı içerir. Sık

18. Gebelikte ortaya çıkan aşırı bulantı ve kusmalara neden olan
tablo aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Hiperemesis Gravidarum
B) HELLP Sendromu
C) Preeklamsi
D) Eklamsi
E) Ablasio Plesanta

Cevap açıklama:Hiperemesis Gravidarum: Gebelikte ortaya çıkan aşırı bulantı ve kusmalardır. Hiperemesis gravidaruma; HCG ya da estrogen düzeyindeki artmaya aşırı reaksiyon, mol hidatiform,

19. Aşağıdakilerden hangisi özofagus varis kanamalarının belirti ve bulguları için yanlıştır?

- A) Kanama çoğunlukla ani başlar ve fazla miktardır.
- B) Kanama ağızdan fışkırır tarzda olur ve katran renklidir.
- C) Kontrolü zor kanamalardır.
- D) Hastada dalak ve karaciğer büyümesi olur.
- E) Hipotansiyon görülebilir.

Cevap açıklama:

20. Aşağıdakilerden hangisi Adrenal Krizde görülen belirti ve bulgulardan biri değildir?

- A) Hâlsizlik
- B) Kilo kaybı
- C) Dehidratasyon
- D) Hipotansiyon
- E) Hiperglisemi

Cevap açıklama:Hastada halsizlik, kilo kaybı, bilinç değişikliği, iştahsızlık, bulantı, kusma, karın ağrısı, bayılma ve dehidratasyon görülebilir. Hipotansiyon ve hipoglisemi tespit edilebilir.

CEVAP ANAHTARI

1. B 2. E 3. C 4. B 5. A 6. C 7. E 8. B 9. E 10. C 11. D 12. E 13. D 14. E 15. A 16. C 17. B 18. A 19. B 20. E

AİA-AOT